



**ЗАТВЕРДЖЕНО**  
Наказ Міністерства охорони здоров'я України  
**30.04.14 № 294**  
Реєстраційне посвідчення  
№ UA/4566/01/01

## **ІНСТРУКЦІЯ для медичного застосування препарату ЕЛЕУТЕРОКОК**

### **Склад лікарського засобу:**

**діюча речовина:** 1 флакон містить екстракт рідкий із кореневищ з коренями елеутерококу колючого (*Rhizoma et radices Eleutherococci*) (1:1);

**допоміжні речовини:** етанол (96 %), вода очищена.

**Лікарська форма.** Екстракт рідкий для перорального застосування, спиртовий.

Рідина темно-коричневого кольору, в тонкому шарі прозора, зі специфічним запахом. При зберіганні допускається утворення осаду.

### **Назва і місцезнаходження виробника.**

ПАТ «Лубнифарм». вул. Петровського, 16, м. Лубни, Полтавська обл., Україна, 37500.

**Фармакотерапевтична група.** Тонізуючі засоби.

Код АТС А13А.

До складу кореневищ з коренями входять елеутерозиди А, В, В<sub>1</sub>, С, D, E, F і G; похідні кумарину, флавоноїди, ефірна олія, рослинний віск, смоли, крохмаль. Завдяки наявності елеутерозидів Елеутерокок підвищує фізичну та розумову працездатність, стійкість до несприятливих факторів навколишнього середовища, підвищує гостроту зору, стимулює серцево-судинну систему, послаблює стресові реакції, чинить деяку стимулюючу гонадотропну та гіпогікемічну дію.

Препарат добре всмоктується в травному тракті, виводиться з організму, головним чином, нирками.

**Показання для застосування.** Фізична та розумова перевтоми, неврастенія і психостенія, артеріальна гіпотензія, функціональне виснаження центральної нервової системи, що супроводжується зниженням працездатності, дратівливості і безсонням.

У складі комплексної терапії при вегетоневрозах, після тяжких хірургічних операцій, при гострій та хронічній променевої хвороби.

**Протипоказання.** Підвищена чутливість до компонентів препарату. Гіпертермічний синдром, артеріальна гіпертензія, підвищена збудливість, гострі інфекційні захворювання, інфаркт міокарда, аритмії, безсоння, нейроциркуляторна дистонія, гарячка, епілепсія.

**Належні заходи безпеки при застосуванні.** При прийомі препарату необхідно контролювати артеріальний тиск.

Препарат може спричинити безсоння. Тому особам, на яких препарат діє таким чином, його не слід приймати ввечері.

Перед застосуванням збовтувати.

### **Особливі застереження.**

**Застосування у період вагітності або годування груддю.** Не застосовують.

**Здатність впливати на швидкість реакції при керуванні автотранспортом або роботі з іншими механізмами.** Через можливість виникнення побічних реакцій з боку центральної нервової системи та через те, що препарат містить етанол 40 % слід утримуватися від керування автотранспортом або роботи з іншими механізмами, що впливають на швидкість психомоторної реакції.

**Діти.** Не застосовують дітям віком до 12 років.

### **Спосіб застосування та дози.**

Елеутерокок призначають внутрішньо за 30 хв до вживання їжі: дорослим – по 20-40 крапель 2-3 рази на добу, дітям віком від 12 років призначають із розрахунку 1 крапля на 1 рік життя дитини 2 рази на добу. Курс лікування становить 25-30 днів; за необхідності повторюють через 1-2 тижні.

### **Передозування.**

**Симптоми:** можливе підвищення артеріального тиску, порушення ритму серця, підвищена збудливість, порушення сну.

**Лікування.** Терапія симптоматична.

### **Побічні ефекти.**

**З боку центральної нервової системи:** безсоння, підвищена збудливість, головний біль.

**З боку серцево-судинної системи:** підвищення артеріального тиску, порушення ритму серця, тахікардія.

**З боку шкіри:** висипання, почервоніння шкіри, свербіж.

Тривале застосування може спричинити м'язовий спазм, порушення з боку травного тракту.

### **Взаємодія з іншими лікарськими засобами та інші види взаємодій.**

Препарат посилює дію стимуляторів центральної нервової системи і аналептиків, є фізіологічним антагоністом засобів, що пригнічують центральну нервову систему (у тому числі барбітуратів, транквілізаторів, протиепілептичних засобів).

Екстракт елеутерококу може потенціювати дію гіпогікемічних засобів.

**Термін придатності.** 4 роки.

**Умови зберігання.** Зберігати у захищеному від світла місці в оригінальній упаковці при температурі від 8 °С до 15 °С. Зберігати в недоступному для дітей місці.

**Упаковка.** По 50 мл у флаконах.

**Категорія відпуску.** Без рецепта.

**Дата останнього перегляду.**