



**ЗАТВЕРДЖЕНО**  
Наказ Міністерства охорони здоров'я України  
**30.04.14 № 294**  
Реєстраційне посвідчення № UA/8112/01/01

## **ІНСТРУКЦІЯ для медичного застосування препарату ОКСОЛІН**

**Склад лікарського засобу:** діюча речовина: 1 г мазі містить оксоліну 2,5 мг; допоміжні речовини: олія мінеральна, парафін білий м'який.

**Лікарська форма.** Мазь. Густа однорідна маса білого або білого з жовтуватим відтінком кольору. При зберіганні допускається поява рожевого відтінку.

**Назва і місцезнаходження виробника.** ПАТ «Лубнифарм».

вул. Петровського, 16, м. Лубни, Полтавська обл., Україна, 37500.

**Фармакотерапевтична група.** Засоби, що застосовуються в офтальмології. Проти-вірусні засоби. Код АТС S01A D.

Оксолін – протівірусний засіб для зовнішнього застосування. Має вірусозидну активність, блокуючи місця зв'язування вірусу грипу (здебільшого типу  $A_2$ ) з поверхнею клітинної мембрани, захищає клітини від проникнення в них вірусу. До дії оксоліну чутливі також віруси *Herpes simplex*, оперізувального герпесу, аденовіруси, віруси інфекційних бородавок та контагіозного моллюска.

Препарат не токсичний, при місцевому застосуванні системної дії не виявлено, в організмі не накопичується. При нанесенні на слизову оболонку всмоктується 20 % препарату, виводиться здебільшого нирками протягом доби.

**Показання для застосування.** Профілактика грипу, лікування вірусного риніту.

**Протипоказання.** Індивідуальна підвищена чутливість до діючої речовини або до інших компонентів препарату.

**Належні заходи безпеки при застосуванні.** Мазь не призначена для нанесення на слизову оболонку очей. Препарат не можна наносити на уражену шкіру.

**Особливі застереження.**

**Застосування у період вагітності або годування груддю.** Дані щодо безпеки та ефективності застосування Оксоліну у період вагітності або годування груддю відсутні, тому препарат не бажано застосовувати у ці періоди.

**Здатність впливати на швидкість реакції при керуванні автотранспортом або роботі з іншими механізмами.** Не впливає.

**Діти.** Дані щодо безпеки та ефективності застосування препарату дітям відсутні.

**Спосіб застосування та дози.**

**Профілактика грипу:** препарат наносити на слизову оболонку носа щоденно 2-3 рази на добу протягом 25 днів або при контакт з хворими.

**Лікування вірусного риніту:** препарат наносити на слизову оболонку носа щоденно 2-3 рази на добу протягом 3-4 днів.

**Передозування.** Про випадки передозування дотепер не повідомлялося.

**Симптоми:** можливі відчуття печіння на слизовій оболонці носа та ринорея.

**Лікування:** припинити застосування мазі, залишки засобу змити теплою водою.

**Побічні ефекти.** У місці нанесення мазі може виникати відчуття печіння, яке швидко минає; посилення виділень з носа; забарвлення слизової оболонки у синій колір. Можливий розвиток реакцій гіперчутливості.

**Взаємодія з іншими лікарськими засобами та інші види взаємодій.** Одночасне інтраназальне застосування з адреноміметичними засобами може призвести до пересушування слизової оболонки носа.

**Термін придатності.** 2 роки.

**Умови зберігання.** Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 10 °С. Зберігати у недоступному для дітей місці. Не допускається заморожування.

**Упаковка.** Мазь 0,25 % по 10 г у тубах № 1.

**Категорія відпуску.** Без рецепта.

**Дата останнього перегляду.**