



ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства охорони здоров'я України

08.05.14 № 313

Реєстраційне посвідчення № UA/8737/01/01

ІНСТРУКЦІЯ

для медичного застосування препарату РИЦИНОВА ОЛІЯ

Склад лікарського засобу: *діюча речовина:* рицинова олія;
1 флакон містить 30 мл, 50 мл, 100 мл рицинової олії.

Лікарська форма. Олія. Рідина прозора, густа і в'язка, безбарвна або злегка жовтувата зі слабким запахом і своєрідним, неприємним смаком. На повітрі у тонкому шарі повільно густішає, але не утворює щільної або твердої плівки.

Назва і місцезнаходження виробника. ПАТ «Лубнифарм».

Україна, 37500, Полтавська обл., м. Лубни, вул. Петровського, 16.

Фармакотерапевтична група. Проносний засіб. Код АТС А06А В05. При застосуванні внутрішньо гідролізується ліпазою у тонкому кишечнику з утворенням рицинолевої кислоти, яка спричиняє подразнення рецепторів кишечника та рефлекторно посилює його перистальтику. Проносний ефект настає зазвичай через 5-6 годин. Препарат також спричиняє рефлекторне скорочення міометрія.

Показання для застосування. Запори.

Протипоказання. Підвищена чутливість до препарату; підвищена чутливість до рослин родини молочайних (*Euphorbiaceae*); отруєння жиророзчинними речовинами (фосфором, бензолом, фенолом); виразкова хвороба шлунка та дванадцятипалої кишки, виразковий коліт; отруєння жиророзчинними протигельмінтними засобами, екстрактом папороті чоловічої; гострі запальні процеси у черевній порожнині (апендицит, перитоніт); маткові кровотечі; кахексія; літній вік; недиагностований біль у ділянці живота; обструкція жовчовивідних протоків; тяжка дегідратація.

Належні заходи безпеки при застосуванні. Відсутні. *Не слід порушувати правила застосування лікарського засобу, це може зашкодити Вашому здоров'ю.*

Особливі застереження.

Застосування у період вагітності або годування груддю. Застосування препарату протипоказане у період вагітності. У період годування груддю препарат слід застосовувати лише в тому разі, коли очікувана користь для матері перевищує можливий ризик для дитини.

Здатність впливати на швидкість реакції при керуванні автотранспортом або роботі з іншими механізмами. Даних немає.

Діти. Препарат застосовують дітям віком від 12 років.

Спосіб застосування та дози. Застосовувати внутрішньо. Рекомендована доза для дорослих та дітей від 12 років – 15-30 мл за прийом. Якщо препарат застосовувати для очищення кишечника перед діагностичними процедурами, то доцільно вжити його за 6 годин до проведення процедури.

Передозування. *Симптоми:* нудота, блювання, біль у животі, діарея.

Лікування: симптоматична терапія.

Побічні ефекти. Нудота, блювання, діарея, біль у животі, порушення водно-електролітного балансу. Після спорожнення кишечника можливий запор. При тривалому застосуванні – порушення травлення, ентероколіт, розвиток звикання, атонія кишечника. Можливі алергічні реакції.

Взаємодія з іншими лікарськими засобами та інші види взаємодій. Не рекомендовано застосовувати Рицинову олію одночасно з екстрактом папороті чоловічої.

Термін придатності. 5 років.

Умови зберігання. Зберігати в оригінальній упаковці при температурі від 8 до 15 °С. Зберігати у недоступному для дітей місці.

Упаковка. По 30 мл, 50 мл, 100 мл у флаконах.

Категорія відпуску. Без рецепта.

Дата останнього перегляду.