



**ЗАТВЕРДЖЕНО**  
Наказ Міністерства охорони здоров'я України  
**07.06.2013 № 480**  
Реєстраційне посвідчення  
**№ UA/7941/01/01**

Зміни внесено  
Наказ Міністерства охорони здоров'я України  
**30.04.2014 № 294**

## ІНСТРУКЦІЯ для медичного застосування препарату АНТИТРОМБ

### Склад лікарського засобу:

*діюча речовина:* 1 г мазі містить емоксипіну 10 мг;  
*допоміжні речовини:* олія рицинова; пропіленгліколь;  
емульгатор № 1; бронітрол; вода очищена;  
*допоміжні речовини, що входять до складу емульгатору № 1:* спирт цетиловий, спирт стеарильовий.

### Лікарська форма. Мазь.

Мазь білого кольору, однорідної консистенції, зі слабким специфічним запахом.

### Назва і місцезнаходження виробника.

ПАТ «Лубнифарм».  
вул. Петровського, 16, м. Лубни, Полтавська обл.,  
Україна, 37500.

### Фармакотерапевтична група. Капіляропротекторні засоби.

Код АТС C05C X.

Препарат чинить пряму антикоагулянтну дію, знижує в'язкість крові, зменшує проникність судинної стінки, нормалізує мікроциркуляторний гемостаз, покращує функціональний стан ішемізованих тканин, також виявляє протизапальну, тромболітичну і регенеруючу дію.

Мазева основа – пропіленгліколь – забезпечує проникність емоксипіну на глибину розташування поверхневих судин. Максимальне вивільнення діючої речовини розпочинається з 30-ї хвилини після нанесення мазі і досягає максимальної концентрації через 1,5 години. Ця концентрація утримується протягом 6-8 годин.

**Показання для застосування.** У складі комплексного лікування: поверхневий гострий тромбофлебіт, гострий аноректальний тромбоз, післяін'єкційний флебіт.

**Протипоказання.** Підвищена індивідуальна чутливість до складових препарату.

**Належні заходи безпеки при застосуванні.** При наявності відкритих ушкоджень мазь наносять тільки на прилеглі тканини.

### Особливі застереження.

**Застосування у період вагітності або годування груддю.** Оскільки досвід застосування препарату у період вагітності або годування груддю обмежений, призначення мазі можливе лише тільки тоді, коли очікувана користь для матері перевищує потенційний ризик для плода або дитини.

**Здатність впливати на швидкість реакції при керуванні автотранспортом або роботі з іншими механізмами.** Не впливає.

**Діти.** Безпека та ефективність застосування препарату дітям не вивчені, тому не слід призначати Анти тромб цій віковій категорії пацієнтів.

**Спосіб застосування та дози.** Дорослим мазь наносити на уражену шкіру тонким шаром (0,1 г/см<sup>2</sup>) 3 рази на добу. При аноректальному тромбозі 1-3 г мазі наносити 2 рази на добу. Курс лікування – 5-10 днів.

**Передозування.** Не спостерігалось.

**Побічні ефекти.** При нанесенні мазі на шкіру можливе виникнення легкого печіння та подразнення шкіри, що зникають через 2-3 хв. Можливий розвиток реакцій гіперчутливості.

*У разі появи будь-яких небажаних явищ необхідно звернутися до лікаря.*

**Взаємодія з іншими лікарськими засобами та інші види взаємодій.** Не рекомендується одночасне застосування з розчинами солей важких металів для запобігання утворення важкорозчинних комплексів.

*При одночасному застосуванні будь-яких інших лікарських засобів слід повідомити лікаря.*

**Термін придатності.** 3 роки.

**Умови зберігання.** Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 15 °С.

Зберігати у недоступному для дітей місці.

**Упаковка.** По 30 г у тубах № 1.

**Категорія відпуску.** Без рецепта.

**Дата останнього перегляду.**