



ЗАТВЕРДЖЕНО  
Наказ Міністерства охорони здоров'я України  
30.04.14 № 294  
Реєстраційне посвідчення  
№ UA/5394/01/01

## ІНСТРУКЦІЯ для медичного застосування препарату ЖЕНЬШЕНЬ

### Склад лікарського засобу:

діюча речовина: 1 флакон містить настойки женьшеню (*Tincturae Ginseng*) (1:10) (екстрагент – етанол 70,0 % (об/об)).

**Лікарська форма.** Настойка для перорального застосування. Прозора рідина жовтуватого кольору. При зберіганні допускається утворення осаду.

**Назва і місцезнаходження виробника.**

ПАТ «Лубнифарм».

вул. Петровського, 16, м. Лубни, Полтавська обл., Україна, 37500.

**Фармакотерапевтична група.**

Тонізуючі засоби. Код АТС А13А.

Препарат чинить адаптогенну, тонізуючу, гіпертензивну дію. Посилює процеси збудження у нейронах кори та стовбурових відділах головного мозку, покращує рефлексорну діяльність, активізує обмін речовин, підвищує працездатність. Ефекти препарату є дозозалежними: при застосуванні у низьких дозах спостерігається посилення збудження та послаблення гальмівних процесів, у високих – посилення останніх.

**Показання для застосування.** Зниження розумової та фізичної працездатності, астеничні стани, період одужання після тяжких захворювань, послаблення статевої функції неврастенічного генезу (у складі комплексної терапії).

**Протипоказання.** Підвищена чутливість до компонентів препарату. Артеріальна гіпертензія, підвищене збудження, безсоння, схильність до кровотеч, гострі інфекційні захворювання, епілепсія.

**Належні заходи безпеки при застосуванні.** Женьшеню настойку не слід приймати у другій половині дня. Необхідно враховувати, що прийом препарату найбільш ефективний восени та взимку.

Перед застосуванням збовтати.

**Особливі застереження.**

**Застосування у період вагітності або годування груддю.** Протипоказано.

**Здатність впливати на швидкість реакції при керуванні автотранспортом або роботі з іншими механізмами.** Оскільки у складі препарату міститься етанол, не рекомендується застосовувати Женьшеню настойку під час керування автомобілем або роботи з іншими механізмами.

**Діти.** Застосовують дітям віком від 12 років тільки за призначенням та під наглядом лікаря.

**Спосіб застосування та дози.** Приймати внутрішньо за 30-40 хв до їди. Разова доза для дорослих становить від 15 до 20 крапель. Препарат приймати 2 рази на добу протягом 30-40 днів. Повторні курси лікування проводять через 2-3 тижні (у разі необхідності).

Дітям віком від 12 років приймати з розрахунку 1 крапля на 1 рік життя.

**Передозування.**

**Симптоми:** головний біль і запаморочення, безсоння, нудота, блювання, підвищення температури тіла, порушення дихання, втрата свідомості, кровоточивість.

**Лікування:** промивання шлунка, застосування сорбентів. Терапія симптоматична.

**Побічні ефекти.** Можливі алергічні реакції (у тому числі почервоніння шкіри, розеольозні висипання, свербіж), кровоточивість ясен і слизової оболонки носа (у тяжких випадках – наявність слідів крові у блювотних масах і випорожненнях), підвищення артеріального тиску, підвищена збудливість, безсоння, головний біль, тахікардія, нудота, блювання.

У разі появи будь-яких небажаних реакцій слід припинити лікування та звернутися до лікаря.

**Взаємодія з іншими лікарськими засобами та інші види взаємодій.** Женьшень, настойка посилює дію психостимуляторів, аналгетиків, анестетиків, кофеїну, камфори, фенаміну та інших стимуляторів центральної нервової системи. Знижує дію снодійних лікарських засобів, нейролептиків. Препарат є фізіологічним антагоністом барбітуратів, тому їх одночасне застосування не раціональне. Не застосовувати разом з антидепресантами, алкоголем.

**Термін придатності.** 3 роки.

**Умови зберігання.** Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °С. Зберігати у недоступному для дітей місці.

**Упаковка.** По 50 мл у флаконі № 1.

**Категорія відпуску.** Без рецепта.

**Дата останнього перегляду.**