



ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства охорони здоров'я України
30.04.14 № 294
Реєстраційне посвідчення
№ UA/7192/01/01

ІНСТРУКЦІЯ
для медичного застосування препарату
СІРЧАНА МАЗЬ ПРОСТА

Склад лікарського засобу:

діюча речовина: 1 г мазі містить сірки для зовнішнього застосування 333 мг;
допоміжні речовини: емульсія консистентна: вода очищена, парафін білий м'який, емульгатор «Т-2», олія мінеральна.

Лікарська форма. Мазь.

Густа однорідна маса жовтуватого із зеленуватим відтінком кольору.

Назва і місцезнаходження виробника. ПАТ «Лубнифарм».

вул. Петровського, 16, м. Лубни, Полтавська обл., Україна, 37500.

Фармакотерапевтична група. Препарати для лікування акне. Препарати, що містять сірку. Код АТС D10A B02.

Показання для застосування. Захворювання шкіри – себорея, сикоз, мікози, псоріаз. Лікування корости (у складі комбінованої терапії).

Протипоказання. Підвищена чутливість до препарату.

Належні заходи безпеки при застосуванні. Не допускати потрапляння мазі на слизові оболонки та в очі. Руки після нанесення мазі слід ретельно мити.

Особливі застереження.

Застосування у період вагітності або годування груддю. Безпека та клінічна ефективність застосування препарату у період вагітності або годування груддю не вивчалися, тому застосовувати мазь у цей період можна лише тоді, коли очікувана користь для матері перевищує потенційний ризик для плода або дитини.

Здатність впливати на швидкість реакції при керуванні автотранспортом або роботі з іншими механізмами. Застосування мазі не впливає на здатність керувати автомобілем або працювати з іншими механізмами.

Діти. Препарат протипоказаний дітям віком до 3 років. Дітям віком від 3 до 12 років застосовувати препарат можна тільки за рекомендацією лікаря з урахуванням співвідношення користь/ризик.

Спосіб застосування та дози. Препарат застосовують зовнішньо. Мазь наносять на уражені ділянки шкіри 2-3 рази на добу. При лікуванні корости схему застосування препарату і вимоги дотримання правил особистої гігієни визначають індивідуально. Тривалість курсу лікування залежить від досягнутого терапевтичного ефекту і переносимості препарату.

Передозування. Не спостерігалось.

Побічні ефекти. Алергічні реакції.

Взаємодія з іншими лікарськими засобами та інші види взаємодій. При одночасному застосуванні з препаратами для зовнішнього застосування можуть створюватися нові сполуки з непередбачуваним ефектом. Взаємодія мазі з окиснювачами (пероксидом водню, калію перманганатом) може призвести до хімічного опіку.

Термін придатності. 2 роки.

Умови зберігання. Зберігати в оригінальній упаковці при температурі від 8 °С до 15 °С. Зберігати в недоступному для дітей місці.

Упаковка. По 25 г у банки, по 40 г у тубах, по 40 г у тубах № 1.

Категорія відпуску. Без рецепта.

Дата останнього перегляду.