



ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства охорони здоров'я України
28.05.14 № 364
Реєстраційне посвідчення
№ УА/4584/01/01

ІНСТРУКЦІЯ для медичного застосування препарату АЛОРОМ

Склад лікарського засобу:

діючі речовини: 1 г лініменту містить: соку листа алое деревовидного свіжого (*Aloe arborescens* Mill.) – 478 мг, екстракту рідкого (1:1) ромашки квіток (*Matricariae flos*) – 200 мг, екстракту рідкого (1:1) нагідок (календули) квіток (*Calendulae flos*) – 100 мг, левоментолу – 1 мг, евкаліптові олії – 1 мг; *допоміжні речовини:* олія рицинова, емульгатор № 1; *допоміжні речовини, що входять до складу соку листа алое деревовидного свіжого:* етанол (96 %), хлорбутанол, геміглідрат; *до складу екстракту рідкого (1:1) ромашки квіток та екстракту рідкого (1:1) нагідок (календули) квіток:* етанол (96 %), вода очищена.

допоміжні речовини, що входять до складу емульгатору № 1: спирт цетиловий, спирт стеариловий.

Лікарська форма. Лінімент. Однорідна густа маса від світло-коричневого до коричневого з зеленуватим відтінком кольору зі специфічним запахом.

Назва і місцезнаходження виробника. ПАТ «Лубнифарм».

Україна, 37500, Полтавська обл., м. Лубни, вул. Петровського, 16.

Фармакотерапевтична група. Засоби, що застосовуються місцево при болю у суглобах та м'язях.

Код АТС M02A X10.

Алором – комбінований препарат, виявляє протизапальний та знеболювальний ефект, покращує трофічні процеси, пов'язані з комплексним впливом фізіологічно активних речовин рослин, що входять до його складу (флавоноїди, дубильні речовини, антрахіноїни тощо). Препарат сприяє репарації тканин, розсмоктуванню гематом.

Показання для застосування. У складі комплексної терапії при лікуванні посттравматичних артритів, плекситів, радикулітів, поліартритів, міозитів, тендовагінітів, зовнішніх гематом, при міалгіях; для профілактики пролежнів.

Протипоказання. Підвищена чутливість до компонентів препарату, до рослин родини складноцвітих. Вагітність. Дитячий вік до 6 років.

Належні заходи безпеки при застосуванні. Лінімент не можна наносити на відкриті рани та ушкоджену шкіру. Для посилення терапевтичного ефекту рекомендується сухе зігрівальне закутування болючих місць.

Особливі застереження.

Застосування у період вагітності або годування груддю. У період вагітності або годування груддю препарат не застосовують.

Здатність впливати на швидкість реакції при керуванні автотранспортом або роботі з іншими механізмами. Невідома.

Діти. Застосування препарату дітям віком до 6 років протипоказано.

Спосіб застосування та дози. Застосовують зовнішньо дорослим і дітям віком старше 6 років. Лінімент наносять тонким шаром на шкіру 2-3 рази на добу, злегка масажуючи уражені місця. Площа нанесення залежить від розміру та локалізації осередку ураження. Курс лікування становить від 5 до 15 днів. У разі необхідності курс лікування повторюють через 1-2 тижні після консультації з лікарем.

Передозування. При передозуванні можливе посилення побічної дії. Терапія – симптоматична.

Побічні ефекти. В окремих випадках можливі алергічні реакції у вигляді подразнення шкіри, висипань, свербіж, контактного дерматиту.

Взаємодія з іншими лікарськими засобами та інші види взаємодій. Не встановлена.

Термін придатності. 2 роки.

Умови зберігання. Зберігати в оригінальній упаковці при температурі від 8 °С до 15 °С. Не допускається заморожування. Зберігати в недоступному для дітей місці. Після розкриття туби лінімент зберігати протягом курсу лікування.

Упаковка. По 30 г у тубах.

Категорія відпуску. Без рецепта.

Дата останнього перегляду.