



ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
охорони здоров'я України
08.05.14 № 313
Реєстраційне посвідчення
№ UA/7464/01/01

ІНСТРУКЦІЯ
для медичного застосування препарату
ГЛОДУ НАСТОЙКА

Склад лікарського засобу: *діюча речовина:* 1 флакон містить застойки плодів глоду (*Crataegi fructus*) (1:10) (екстрагент – етанол 70 % (об/об)) – 25 мл або 100 мл;

Лікарська форма. Настойка для перорального застосування. Прозора рідина від жовтого до коричневого кольору з оранжувато-червонуватим відтінком. При зберіганні допускається утворення осаду.

Назва і місцезнаходження виробника. ПАТ «Лубнифарм», вул. Петровського, 16, м. Лубни, Полтавська обл., Україна, 37500.

Фармакотерапевтична група. Засоби, що застосовуються у кардіології. Код АТС С01Е В04.

Біологічно активні речовини, що містяться у плодах глоду, посилюють кровообіг у коронарних судинах та судинах головного мозку, підвищують чутливість міокарда до серцевих глікозидів і зменшують його збудливість, що призводить до певного посилення скорочень серцевого м'яза. Препарат добре всмоктується при прийомі внутрішньо. Ефект настає через 30 хвилин – 1 годину.

Показання для застосування. Функціональні розлади діяльності серцево-судинної системи (у тому числі нейроциркуляторна дистонія), а також як допоміжний лікарський засіб при легких формах порушень серцевого ритму (миготлива аритмія, пароксизмальна тахікардія).

Протипоказання. Підвищена чутливість до компонентів препарату. Виражена артеріальна гіпотензія і брадикардія.

Належні заходи безпеки при застосуванні. Препарат не рекомендується приймати під час прийому їжі, щоб уникнути взаємодії з її компонентами.

Особливі застереження.

Застосування у період вагітності або годування груддю. Протипоказане.

Здатність впливати на швидкість реакції при керуванні автотранспортом або роботі з іншими механізмами. Препарат містить етиловий спирт та може спричинити сонливість, тому у період застосування препарату слід утриматися від керування автотранспортними засобами або роботи з потенційно небезпечними механізмами.

Діти. Дітям віком до 12 років протипоказане застосування препарату.

Спосіб застосування та дози. Застосовувати внутрішньо до їди. Дорослим рекомендується приймати по 20 крапель настойки 3 рази на добу, дітям від 12 років – із розрахунку 1 крапля на 1 рік життя 3 рази на добу до досягнення стабільного терапевтичного ефекту. Тривалість лікування визначається лікарем індивідуально.

Передозування.

Симптоми: зниження артеріального тиску, сонливість, брадикардія.
Лікування: припинення прийому препарату. Терапія симптоматична.

Побічні ефекти. Сонливість, значне уповільнення серцевого ритму, алергічні реакції (у тому числі гіперемія, висипання, свербіж, набряк шкіри).

Взаємодія з іншими лікарськими засобами та інші види взаємодій. Глоду настойка має потенціювати дію серцевих глікозидів та антиаритмічних засобів. Застосування із солями алкалоїдів не рекомендується у зв'язку з можливістю утворення негативних комплексів. Не слід застосовувати препарат разом із цизапридом. Може посилювати дію снодійних, седативних, гіпотензивних засобів.

Термін придатності. 4 роки.

Умови зберігання. Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °С. Зберігати у недоступному для дітей місці.

Упаковка. По 25 мл або 100 мл у флаконах.

Категорія відпуску. Без рецепта.

Дата останнього перегляду.